$2a=\sin 2x+2a$，所以方程 $\sin 2x+2a=-1$ 有解，所以 $-1\leqslant a\leqslant 0$，故所求 a 的取值范围是 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$.

10.A

提示：$f'(x)=[x^2+(a+2)x+a-1]\cdot e^{x-1}$，则 $f'(-2)=[4-2(a+2)+a-1]\cdot e^{-3}=0\Rightarrow a=-1$，所以 $f(x)=(x^2-x-1)\cdot e^{x-1}$，$f'(x)=(x^2+x-2)\cdot e^{x-1}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=-2$ 或 $x=1$. 当 $x<-2$ 或 $x>1$ 时，$f'(x)>0$；当 $-2<x<1$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 的极小值为 $f(1)=-1$.

11.D

12.C

提示：函数 $f(x)$ 的零点满足 $x^2-2x=-a(e^{1-x}+e^{-x+1})$，设 $g(x)=e^{x-1}+e^{-x+1}$，则 $g'(x)=e^{x-1}-e^{-x+1}=e^{x-1}-\frac{1}{e^{x-1}}=\frac{e^{2(x-1)}-1}{e^{x-1}}$，令 $g'(x)=0$，得 $x=1$. 当 $x<1$ 时，$g'(x)<0$，函数 $g(x)$ 单调递减；当 $x>1$ 时，$g'(x)>0$，函数 $g(x)$ 单调递增. 当 $x=1$ 时，函数 $g(x)$ 取得最小值，最小值为 $g(1)=2$. 设 $h(x)=x^2-2x$，当 $x=1$ 时，函数 $h(x)$ 取得最小值，最小值为 -1. 显然 $a\neq 0$，若 $-a>0$，函数 $h(x)$ 与函数 $-ag(x)$ 的交点个数为 0 或 2；若 $-a<0$，当 $-ag(1)=h(1)$ 时，函数 $h(x)$ 和 $-ag(x)$ 只有一个交点，即 $-a\times 2=-1$，解得 $a=\frac{1}{2}$. 故选 C.

二、填空题

13.$\frac{\sqrt{2}}{2}$

提示：因为 $\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=-\cos x\big|_0^{\pi}=2>\sqrt{2}$，所以 $\sqrt{2}\otimes\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=\sqrt{2}\otimes 2=\frac{2-1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

14.$\left[\frac{1}{3},+\infty\right)$

15.6

16.M=N

三、解答题

17.**证明**：因为 $x\geqslant 1,y\geqslant 1$，所以 $x+y+\frac{1}{xy}\leqslant\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+xy\Leftrightarrow xy(x+y)+1\leqslant y+x+(xy)^2$.

将上式中的右式减左式，得

$[y+x+(xy)^2]-[xy(x+y)+1]=[(xy)^2-1]-[xy(x+y)-(x+y)]=(xy+1)(xy-1)-(x+y)(xy-1)=(xy-1)(xy-x-y+1)=(xy-1)(x-1)(y-1)$.

因为 $x\geqslant 1,y\geqslant 1$，所以 $(xy-1)(x-1)(y-1)\geqslant 0$，从而所要证明的不等式成立.

18.**解**：$z_2=\frac{15-5i}{(2+i)^2}=\frac{15-5i}{3+4i}=\frac{5(3-i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}=\frac{5-15i}{5}=1-3i$.

(1)$z_1+\overline{z_2}=(2-3i)+(1+3i)=3$.

(2)$z_1\cdot z_2=(2-3i)(1-3i)=2-9-9i=-7-9i$.

(3)$\frac{z_1}{z_2}=\frac{2-3i}{1-3i}=\frac{(2-3i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)}=\frac{2+9+3i}{10}=\frac{11}{10}+\frac{3}{10}i$.

19.**解**：(1)因为 $z=\frac{(1-i)^2+3(1+i)}{2-i}=\frac{-2i+3+3i}{2-i}=\frac{3+i}{2-i}=\frac{(3+i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{5+5i}{5}=1+i$，

所以若复数 z_1 与 z 在复平面上所对应的点关于虚轴对称，则它们实部互为相反数，虚部相等，所以 $z_1=-1+i$.

(2)因为复数 $z_2=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$ 满足 $z^2+az+b=1-i$，

所以 $(1+i)^2+a(1+i)+b=1-i$，

整理，得 $a+b+(2+a)i=1-i$，

所以 $\begin{cases}a+b=1,\\2+a=-1,\end{cases}$

解得 $a=-3,b=4$.

所以复数 $z_2=-3+4i$，

所以 z_2 的共轭复数为 $-3-4i$.

20.**解**：(1)当 m=-2 时，$f(x)=e^x(x^3-2x^2-2x+2)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$.

因为 $f'(x)=e^x(x^3-2x^2-2x+2)+e^x(3x^2-4x-2)=xe^x(x^2+x-6)=(x+3)x(x-2)e^x$，

令 $f'(x)=0$，得 x=-3，或 x=0，或 x=2，

所以当 $x\in(-\infty,3)$ 或 $x\in(0,2)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(-3,0)$ 或 $x\in(2,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$.

所以 f(x)在 $(-\infty,3)$ 上单调递减，在 $(-3,0)$ 上单调递增，在 $(0,2)$ 上单调递减，在 $(2,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f(x)_{极小值}=f(-3)=-39e^{-3}$，$f(x)_{极小值}=f(2)=-2e^2$，$f(x)_{极大值}=f(0)=2$.

(2)$f'(x)=e^x(x^3+mx^2-2x+2)+e^x(3x^2+2mx-2)=xe^x[x^2+(m+3)x+2m-2]$.

因为 f(x)在 $[-2,-1]$ 上单调递增，

所以当 $x\in[-2,-1]$ 时，$f'(x)\geqslant 0$.

又当 $x\in[-2,-1]$ 时，$xe^x<0$，

所以当 $x\in[-2,-1]$ 时，$x^2+(m+3)x+2m-2\leqslant 0$，

所以 $\begin{cases}(-2)^2-2(m+3)+2m-2\leqslant 0,\\(-1)^2-(m+3)+2m-2\leqslant 0,\end{cases}$

解得 $m\leqslant 4$，

所以当 $m\in(-\infty,4]$ 时，f(x)在 $[-2,-1]$ 上单调递增.

21.(1)**证明**：依题意，$a_n=\sqrt{n^2+1}$，$b_n=n$，$c_n=\sqrt{n^2+1}-n$.

假设 $\{c_n\}$ 是等差数列，则 $2c_2=c_1+c_3$，所以 $2(\sqrt{5}-2)=\sqrt{2}-1+\sqrt{10}-3$.

所以 $2\sqrt{5}=\sqrt{2}+\sqrt{10}$，产生矛盾，所以 $\{c_n\}$ 不是等差数列.

假设 $\{c_n\}$ 是等比数列，则 $c_2^2=c_1c_3$，即 $(\sqrt{5}-2)^2=(\sqrt{2}-1)(\sqrt{10}-3)$.

有 $6=6\sqrt{5}-3\sqrt{2}-\sqrt{10}$，产生矛盾，

所以 $\{c_n\}$ 也不是等比数列.

(2)**解**：因为 $c_{n+1}=\sqrt{(n+1)^2+1}-(n+1)>0$，$c_n=\sqrt{n^2+1}-n>0$，

所以 $\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{\sqrt{(n+1)^2+1}-(n+1)}{\sqrt{n^2+1}-n}=\frac{\sqrt{n^2+1}+n}{\sqrt{(n+1)^2+1}+(n+1)}$，

因为 $0<\sqrt{n^2+1}<\sqrt{(n+1)^2+1}$，

又 $0<n<n+1$，

所以 $\sqrt{n^2+1}+n<\sqrt{(n+1)^2+1}+n+1$，

所以 $0<\frac{\sqrt{n^2+1}+n}{\sqrt{(n+1)^2+1}+(n+1)}<1$，

所以 $0<\frac{c_{n+1}}{c_n}<1$，即 $c_{n+1}<c_n$.

22.(1)**解**：因为 $f(x)=x(ax-a-\ln x)\geqslant 0$，其中 $x>0$，所以 $ax-a-\ln x\geqslant 0$.

令 $g(x)=ax-a-\ln x$，则 $g(1)=0$，$g'(x)=a-\frac{1}{x}=\frac{ax-1}{x}$.

当 $a\leqslant 0$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，但 $g(1)=0$，故当 $x>1$ 时，$g(x)<0$，不合题意.

当 $a>0$ 时，令 $g'(x)=0$，得 $x=\frac{1}{a}$.

当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减；

当 $x>\frac{1}{a}$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增.

若 $0<a<1$，则 $g(x)$ 在 $\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上单调递减，$g\left(\frac{1}{a}\right)<g(1)=0$；

若 $a>1$，则 $g(x)$ 在 $\left(\frac{1}{a},1\right)$ 上单调递增，$g\left(\frac{1}{a}\right)<g(1)=0$；

若 $a=1$，则 $[g(x)]_{\min}=g\left(\frac{1}{a}\right)=g(1)=0$，$g(x)\geqslant 0$.

综上，$a=1$.

(2)**证明**：由(1)知 $f(x)=x^2-x-x\ln x$，$f'(x)=2x-2-\ln x$，$x>0$.

令 $h(x)=2x-2-\ln x$，则 $h'(x)=2-\frac{1}{x}=\frac{2x-1}{x}$，$x>0$.

令 $h'(x)=0$，得 $x=\frac{1}{2}$.

当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$h'(x)<0$，$h(x)$ 单调递减；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增.

所以 $[h(x)]_{\min}=h\left(\frac{1}{2}\right)=1-2+\ln 2=-1+\ln 2<0$.

因为 $h(e^{-2})=2e^{-2}>0$，$h(2)=2-\ln 2>0$，$e^{-2}\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$2\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$，

所以在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上，$h(x)$ 即 $f'(x)$ 各有一个零点.

设 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上的零点分别为 x_0,x_2，

因为 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减，

所以当 $0<x<x_0$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x_0<x<\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减.

因此 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点.

因为 $f'(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，

所以当 $\frac{1}{2}<x<x_2$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；

当 $x>x_2$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增.

因此 x_2 是 $f(x)$ 的极小值点.

所以 $f(x)$ 有唯一的极大值点 x_0.

由前面的证明可知，$x_0\in\left(e^{-2},\frac{1}{2}\right)$，则 $f(x_0)>f(e^{-2})=e^{-4}+e^{-2}>e^{-2}$.

因为 $f'(x_0)=2x_0-2-\ln x_0=0$，

所以 $\ln x_0=2x_0-2$.

又 $f(x_0)=x_0^2-x_0-x_0(2x_0-2)=x_0-x_0^2$，

因为 $0<x_0<\frac{1}{2}$，所以 $f(x_0)<\frac{1}{4}=2^{-2}$.

因此，$e^{-2}<f(x_0)<2^{-2}$.

第 9 期

第 3 版同步周测题参考答案

一、选择题

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B

6.B 7.B 8.B

9.B

提示：设 $z_1=a+bi$，$z_2=c+di(a,b,c,d\in\mathbf{R})$，则 $z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2=(a+bi)(c-di)+(a-bi)(c+di)=(2ac+2bd)\in\mathbf{R}$.

10.C

提示：设 $z=x+yi(x,y\in\mathbf{R})$.

由已知，得 $x^2+y^2+i(2yi)\leqslant 0$，

即 $x^2+y^2-2y\leqslant 0$，即 $x^2+(y-1)^2\leqslant 1$.

故选 C.

11.C

提示：$z^2=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$，$z^3=-1$，$z^4=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$，$z^5=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$，$z^6=1$，所以原式 $=\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)+(-1+\sqrt{3}i)+(-3)+(-2-2\sqrt{3}i)+\left(\frac{5}{2}-\frac{5\sqrt{3}}{2}i\right)+6=3-3\sqrt{3}i=6\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=6\overline{z}$.

12.A

提示：设 $z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$，

所以 $|2z+1|=\sqrt{(2a+1)^2+4b^2}$，$|z-i|=\sqrt{a^2+(b-1)^2}$，

所以 $\sqrt{(2a+1)^2+4b^2}=\sqrt{a^2+(b-1)^2}$，

整理得：$a^2+b^2+\frac{4}{3}a+\frac{2}{3}b=0$，

所以 z 对应的点的轨迹是圆.

故选 A.

二、填空题

13.1

14.5，2

15.1

提示：复数 z_1 和 z_2 在复平面内对应的点 A 的坐标为 $(1,1)$，B 的坐标为 $(-1,1)$，所以 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$.

16.-1

提示：因为 $x+\frac{1}{x}=-1$，所以 $x^2+x+1=0$.

所以 $x=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$，所以 $x^3=1$.

因为 2017=3×672+1，所以 $x^{2017}=x$，

所以 $x^{2017}+\frac{1}{x^{2017}}=x+\frac{1}{x}=-1$.

三、解答题

17.**解**：(1)$\frac{1-\sqrt{3}i}{(\sqrt{3}+i)^2}=\frac{1-\sqrt{3}i}{2+2\sqrt{3}i}=\frac{(1-\sqrt{3}i)^2}{2(1+\sqrt{3}i)(1-\sqrt{3}i)}=-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}i$.

(2)$\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)^3(4+5i)}{(5-4i)(1-i)}=\frac{2\sqrt{2}(1+i)^2(1+i)(4+5i)}{(5-4i)(1-i)}=\frac{2\sqrt{2}\cdot 2i\cdot 2i(4+5i)(5+4i)}{(5-4i)(5+4i)(1-i)(1+i)}=\frac{-8\sqrt{2}\times 41i}{41\times 2}=-4\sqrt{2}i$.

18.**解**：(1)要使复数 z 对应点在 x 轴下方，则 $m^2-2m-15<0$，解得 $-3<m<5$.

(2)要使复数 z 对应点在第四象限，则 $\begin{cases}m^2+5m+6>0,\\m^2-2m-15<0,\end{cases}$ 解得 $-2<m<5$.

(3)要使复数 z 对应点在直线 $x+y+4=0$ 上，则 $(m^2+5m+6)+(m^2-2m-15)+4=0$，解得 m=1，或 $m=-\frac{5}{2}$.

19.**解**：(1)因为 $z=\cos A+i\sin A$，所以 $z+1=1+\cos A+i\sin A$.

所以 $|z+1|=\sqrt{(1+\cos A)^2+\sin^2 A}=\sqrt{2+2\cos A}$.

因为 $|z+1|=1$，所以 $2+2\cos A=1$，所以 $\cos A=-\frac{1}{2}$. 又 $0<A<180°$，所以 $A=120°$.

所以 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

所以复数 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

(2)由正弦定理，得 $a=2R\cdot\sin A$，$b=2R\cdot\sin B$，$c=2R\cdot\sin C$(其中 R 为 $\triangle ABC$ 外接圆的半径)，

所以原式 $=\frac{\sin B-\sin C}{\sin A\cdot\cos(60°+C)}$.

因为 $B=180°-A-C=60°-C$，

所以原式 $=\frac{\sin(60°-C)-\sin C}{\sin 120°\cdot\cos(60°+C)}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\cos C-\frac{3}{2}\sin C}{\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\cos(60°+C)}=\frac{\cos C-\sqrt{3}\sin C}{\cos(60°+C)}=\frac{2\cos(60°+C)}{\cos(60°+C)}=2$，

即 $\frac{b-c}{a\cos(60°+C)}$ 的值为 2.

20.**解**：因为 $(x+\sqrt{3}i)^3=\log_{\sqrt{2}}\frac{1}{2^4}=-8$，

所以 $\left(\frac{x+\sqrt{3}i}{-2}\right)^3=1$，

所以 $\frac{x+\sqrt{3}i}{-2}=1$ 或 $\frac{x+\sqrt{3}i}{-2}=\omega$ 或 $\frac{x+\sqrt{3}i}{-2}=\overline{\omega}\left(其中\ \omega=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$.

若 $x+\sqrt{3}i=-2$，则 $x\notin\mathbf{R}$.

若 $x+\sqrt{3}i=-2\omega=1-\sqrt{3}i$，则 $x\notin\mathbf{R}$.

若 $x+\sqrt{3}i=-2\overline{\omega}=1+\sqrt{3}i$，则 $x=1$.

综上可知，存在满足题意的实数 x 且 $x=1$.

21.**解**：依题意得 z_1+z_2 为实数，因为 $z_1+z_2=\frac{3}{a+5}+\frac{2}{1-a}+[(a^2-10)+(2a-5)]i$，

所以 $\begin{cases}a^2+2a-15=0,\\a+5\neq 0,\\1-a\neq 0,\end{cases}$ 所以 $a=3$.

此时 $z_1=\frac{3}{8}-i$，$z_2=-1+i$，

即 $\overrightarrow{OZ_1}=\left(\frac{3}{8},-1\right)$，$\overrightarrow{OZ_2}=(-1,1)$.

所以 $\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}=\frac{3}{8}\times(-1)+(-1)\times 1=-\frac{11}{8}$.

22.**解**：由题意，得 $z_1=\frac{-1+5i}{1+i}=2+3i$，

于是 $|z_1-\overline{z_2}|=|4-a+2i|=\sqrt{(4-a)^2+4}$，$|z_1|=\sqrt{13}$.

由 $\sqrt{(4-a)^2+4}<\sqrt{13}$，

得 $a^2-8a+7<0$，解得 $1<a<7$.

所以实数 a 的取值范围是 $(1,7)$.

第 10 期

第 2、3 版章节测试题参考答案

一、选择题

1.A

2.B

提示：因为 $z^2=(\cos\theta-i\sin\theta)^2=\cos 2\theta-i\sin 2\theta$，又 $z^2=-1$，所以 $\begin{cases}\cos 2\theta=-1,\\\sin 2\theta=0,\end{cases}$ 再由选择项验证得 $\theta=\frac{\pi}{2}$.

3.A

提示：因为 $(a+i)^2=a^2-1+2ai$，又复数 $(a+i)^2$ 的对应点在 y 轴负半轴上，所以 $\begin{cases}a^2-1=0,\\2a<0,\end{cases}$ 解得 $a=-1$.

4.C

提示：因为 $z=\frac{1+bi}{2+i}=\frac{(1+bi)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{2+b}{5}+\frac{2b-1}{5}i$ 是纯虚数，所以 $2+b=0$ 且 $2b-1\neq 0$，解得 $b=-2$. 所以 $z=-i$，则复数 z 的共轭复数是 i.

5.A

提示：由 $\frac{1-i}{1+i}=-i$，得 $\overrightarrow{OA}=(0,-1)$，$\overrightarrow{OB}=(1,-\sqrt{3})$.

所以 $|\overrightarrow{OA}|=1$，$|\overrightarrow{OB}|=2$，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\sqrt{3}$.

所以 $\cos\angle AOB=\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}|\cdot|\overrightarrow{OB}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

6.A

7.C

8.D

提示：因为 $|(x-2)+yi|=\sqrt{3}$，所以 $(x-2)^2+y^2=3$，所以点 (x,y) 在以 $C(2,0)$ 为圆心，以 $\sqrt{3}$ 为半径的圆上，如图，由平面几何知识知 $-\sqrt{3}\leqslant\frac{y}{x}\leqslant\sqrt{3}$.



9.C

提示：$\frac{a}{b}=\frac{3+2i}{4+xi}$

$=\frac{(3+2i)(4-xi)}{16+x^2}$

$=\frac{12+2x}{16+x^2}+\frac{8-3x}{16+x^2}\cdot i\in\mathbf{R}$，

所以$\frac{8-3x}{16+x^2}=0$，所以 $x=\frac{8}{3}$.

10.B

提示：$z*\bar{z}=\frac{|z|+|\bar{z}|}{2}=\frac{2\sqrt{a^2+b^2}}{2}=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{(a+b)^2-2ab}$，又因为 $ab\leqslant\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$，所以$-ab\geqslant-\frac{9}{4}$，$z*\bar{z}\geqslant\sqrt{9-2\times\frac{9}{4}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

11.A

提示：设 $z=x+yi(x,y\in\mathbf{R})$，则$\bar{z}\cdot i=(x-yi)\cdot i=y+xi=-1+2i$，所以 $y=-1$，$x=2$，故 $z=2-i$.故选 A.

12.D

提示：由条件知 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，

若 $z\in\mathbf{R}$，则 $a^2-a-2=0$，所以 $a=-1$ 或 2，所以 $p_1=\frac{2}{5}$；

若 $z=0$，则$\begin{cases}a^2-1=0,\\a^2-a-2=0,\end{cases}$所以 $a=-1$，所以 $p_3=\frac{1}{5}$；

若 z 为虚数，则 $a^2-a-2\neq0$，所以 $a\neq-1$ 且 $a\neq2$，

所以 $p_2=\frac{3}{5}$；

若 z 为纯虚数，则$\begin{cases}a^2-1=0,\\a^2-a-2\neq0,\end{cases}$所以 $a=1$，所以 $p_4=\frac{1}{5}$.

所以 $p_3=p_4<p_1<p_2$.

二、填空题

13.5

提示：复数 $3-5i$，$1-i$ 和$-2+ai$ 在复平面内对应的点分别为$(3,-5)$，$(1,-1)$，$(-2,a)$，所以由三点共线的条件可得$\frac{-1-(-5)}{1-3}=\frac{a-(-1)}{-2-1}$.解得 $a=5$.

14.$\frac{9}{2}$

提示：把 $x=1+2i$ 代入 $x^2-mx+2n=0$ 中，得$(1+2i)^2-m(1+2i)+2n=0$，即 $1-4+4i-m-2mi+2n=0$，所以$(2n-m-3)+(4-2m)i=0$，

根据复数相等的充要条件，

得$\begin{cases}-3-m+2n=0,\\4-2m=0,\end{cases}$即$\begin{cases}n=\frac{5}{2},\\m=2,\end{cases}$

所以 $m+n=\frac{5}{2}+2=\frac{9}{2}$.

15.0

提示：设 $z=m+ni(m,n\in\mathbf{R})$，

则$\bar{z}=m-ni$.

所以 $b=z\cdot\bar{z}=m^2+n^2$，

$a=\frac{z^2-\bar{z}^2}{2i}=\frac{4mni}{2i}=2mn$.

故 $a-b=2mn-(m^2+n^2)=-(m-n)^2\leqslant0$，即 $a-b$ 的最大值是 0.

16.①②

提示：当 z 为纯虚数时，z 与$\bar{z}$对应的点均在虚轴上，故 P_1,O,P_2 三点共线，①正确；显然③错误；当 $z=0$ 时，$\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$对应的复数均为 0，此时有$\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_2}$，故②正确，④错误.

三、解答题

17.**解**：$z=\frac{(1+i)^2+3(1-i)}{2+i}=\frac{2i+3(1-i)}{2+i}=\frac{3-i}{2+i}=\frac{(3-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=1-i$，

将 $z=1-i$ 代入 $z^2+az+b=1+i$，得$(1-i)^2+a(1-i)+b=1+i$，

即$(a+b)-(a+2)i=1+i$，

所以$\begin{cases}a+b=1,\\-(a+2)=1.\end{cases}$

解得$\begin{cases}a=-3,\\b=4.\end{cases}$

18.**解**：设原方程的一个实根为 $t=t_0$，则有$(t_0^2+2t_0+2xy)+(t_0+x-y)i=0$.

根据复数相等的充要条件有

$\begin{cases}t_0^2+2t_0+2xy=0,①\\t_0+x-y=0,②\end{cases}$

把②代入①中消去 t_0，得$(y-x)^2+2(y-x)+2xy=0$，

即$(x-1)^2+(y+1)^2=2$.

故所求点的轨迹方程为$(x-1)^2+(y+1)^2=2$.

19.**解**：(1)因为 $z\in\mathbf{R}$，所以 $m^2+2m-3=0$ 且 $m-1\neq0$，解得 $m=-3$.

(2)因为 z 是纯虚数，

所以$\begin{cases}\frac{m(m+2)}{m-1}=0,\\m^2+2m-3\neq0,\end{cases}$

解得 $m=0$，或 $m=-2$.

(3)因为 z 对应的点位于复平面第二象限，所以$\begin{cases}\frac{m(m+2)}{m-1}<0,\\m^2+2m-3>0,\end{cases}$

解得 $m<-3$.

所以 $m\in(-\infty,3)$.

(4)因为 z 对应的点在直线 $x+y+3=0$ 上，所以$\frac{m(m+2)}{m-1}+(m^2+2m-3)+3=0$，

解得 $m=0$，或 $m=-2$.

20.**解**：因为 $4(a+bi)+2(a-bi)=3\sqrt{3}+i$，

所以 $6a+2bi=3\sqrt{3}+i$，

所以$\begin{cases}6a=3\sqrt{3},\\2b=1,\end{cases}$所以$\begin{cases}a=\frac{\sqrt{3}}{2},\\b=\frac{1}{2}.\end{cases}$

所以 $z=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$，

所以 $z-\omega=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)-(\sin\theta-i\cos\theta)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\sin\theta\right)+\left(\frac{1}{2}+\cos\theta\right)i$，

所以$|z-\omega|$

$=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\sin\theta\right)^2+\left(\frac{1}{2}+\cos\theta\right)^2}$

$=\sqrt{2-\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta}$

$=\sqrt{2-2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right)}$

$=\sqrt{2-2\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)}$，

因为$-1\leqslant\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)\leqslant1$，所以 $0\leqslant2-2\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)\leqslant4$，

所以 $0\leqslant|z-\omega|\leqslant2$，故所求得 $z=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$，$|z-\omega|$的取值范围是$[0,2]$.

21.**解**：因为 $z=\frac{(-1+3i)(1-i)-(1+3i)}{i}=\frac{1+i}{i}=1-i$，所以$|z|=\sqrt{2}$.又$\left|\frac{\omega}{z}\right|=\frac{|\omega|}{|z|}\leqslant\sqrt{2}$，所以$|\omega|\leqslant2$.

而 $\omega=z+ai=(1-i)+ai=1+(a-1)i$，$a\in\mathbf{R}$，

则$\sqrt{1^2+(a-1)^2}\leqslant2\Rightarrow(a-1)^2\leqslant3$，

所以$-\sqrt{3}\leqslant a-1\leqslant\sqrt{3}$，$1-\sqrt{3}\leqslant a\leqslant1+\sqrt{3}$.

即 a 的取值范围为$[1-\sqrt{3},1+\sqrt{3}]$.

22.(1)**解**：设 $z_1=a+bi(a,b\in\mathbf{R}$ 且 $b\neq0)$，则 $z_2=\bar{z}_1+\frac{1}{\bar{z}_1}=a+bi+\frac{1}{a+bi}=\left(a+\frac{a}{a^2+b^2}\right)+\left(b-\frac{b}{a^2+b^2}\right)i$.

因为 z_2 是实数，$b\neq0$，于是有 $a^2+b^2=1$，即$|z_1|=1$，还可得 $z_2=2a$.

由$-1\leqslant z_2\leqslant1$，得$-1\leqslant2a\leqslant1$，解得$-\frac{1}{2}\leqslant a\leqslant\frac{1}{2}$，即 z_1 的实部的取值范围是$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

(2)**证明**：$\omega=\frac{1-z_1}{1+z_1}=\frac{1-a-bi}{1+a+bi}=\frac{1-a^2-b^2-2bi}{(1+a)^2+b^2}=-\frac{b}{a+1}i$.

因为 $a\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，$b\neq0$，所以 ω 为纯虚数.

第 11 期

第 2,3 版　综合检测题(一)参考答案

一、选择题

1.D

2.B

3.A

4.D

提示：因为$\bar{z}=1+2i$，所以 $z=1-2i$，所以 z 在复平面内对应的点位于第四象限.

5.B

提示：平面区域 M 的面积为 πr^2，由类比知识可知：平面区域 M 绕 y 轴旋转一周得到的旋转体类似于为实心的车轮内胎，旋转体的体积等于以圆(面积为 πr^2)为底，以 O 为圆心、d 为半径的圆的周长 $2\pi d$ 为高的圆柱的体积，所以旋转体的体积 $V=\pi r^2\times2\pi d=2\pi^2r^2d$.

6.A

7.B

提示：对于 A，$f'(x)=-3x^2\leqslant0$ 恒成立，在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，没有极值点；对于 B，$f'(x)=\sin x$，当 $x\in(-\pi,0)$时，$f'(x)<0$，当 $x\in(0,\pi)$时，$f'(x)>0$，故 $f(x)=-\cos x$ 在 $x=0$ 的左侧区间$(-\pi,0)$内单调递减，在其右侧区间$(0,\pi)$内单调递增，所以 $x=0$ 是 $f(x)$的一个极小值点；对于 C，$f'(x)=\cos x-1\leqslant0$ 恒成立，在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，没有极值点；对于 D，$f(x)=\frac{1}{x}$在 $x=0$ 处没有定义，所以 $x=0$ 不可能成为极值点.综上可知，选 B.

8.D

9.A

提示：分别将 $2+ai$，$b+i$ 代入方程得：

$\begin{cases}(2+ai)^2+p(2+ai)+q=0,\quad①\\(b+i)^2+p(b+i)+q=0,\quad②\end{cases}$

对①②整理，由复数相等的先要条件得：

$\begin{cases}2p+q-a^2+4=0,\\(p+4)a=0,\\pb+q+b^2-1=0,\\p+2b=0.\end{cases}$

解得 $p=-4$，$q=5$.

10.B

11.D

提示：因为 $\frac{2-i}{a+i}=\frac{(2-i)(a-i)}{(a+i)(a-i)}=\frac{2a-1-(a+2)i}{a^2+1}$是纯虚数，所以 $2a-1=0\Rightarrow a=\frac{1}{2}$，所以$|z|=\left|2a+1+\sqrt{2}i\right|=\left|2+\sqrt{2}i\right|=\sqrt{6}$，故选 D.

12.A

提示：令 $g(x)=\frac{f(x)}{x^2}$，则 $g'(x)=\frac{xf'(x)-2f(x)}{x^3}$.因为 $2f(x)<xf'(x)$，所以 $g'(x)>0$，所以函数 $g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，所以 $g(a)<g(b)$，即$\frac{f(a)}{a^2}<\frac{f(b)}{b^2}$，所以 $b^2f(a)<a^2f(b)$.令 $h(x)=\frac{f(x)}{x^3}$，则 $h'(x)=\frac{xf'(x)-3f(x)}{x^4}$.因为 $xf'(x)<3f(x)$，所以 $h'(x)<0$，所以函数 $h(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减，所以 $h(a)>h(b)$，即$\frac{f(a)}{a^3}>\frac{f(b)}{b^3}$，所以 $b^3f(a)>a^3f(b)$.故选 A.

二、填空题

13.$(a+b)*(a+c)$

14.3

提示：由$(1+i)^{2n}=-2^n\cdot i$，得$(2i)^n=2^n\cdot i^n=-2^n\cdot i$，所以 $i^n=-i$，即 $n=4k+3$，$k\in\mathbf{N}$，所以最小的正整数为 3.

15.$a>4$

提示：因为 $f(x)=\left(1-\frac{a}{x}\right)e^x(x>0)$，所以 $f'(x)=\left(\frac{a}{x^2}-\frac{a}{x}+1\right)e^x$.因为函数 $f(x)$ 既有极大值又有极小值，所以 $f'(x)=\left(\frac{a}{x^2}-\frac{a}{x}+1\right)e^x=0$ 有 2 个不等实数根，所以$x^2-ax+a=0$ 有 2 个不等的正实数根，所以$\Delta=a^2-4a>0$ 且 $a>0$，所以 $a>4$.

16.-3

提示：由题意可知，$f'(x)=3x^2+2ax+b$，$f'(0)=0$，所以 $b=0$，所以 $f(x)=x^2(x+a)$，有$\frac{27}{4}=\int_0^{-a}[0-(x^3+ax^2)]dx=-\left(\frac{x^4}{4}+\frac{ax^3}{3}\right)\Big|_0^{-a}=\frac{a^4}{12}$，所以 $a=\pm3$.又$-a>0\Rightarrow a<0$，得 $a=-3$.

三、解答题

17.**解**：设 $z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$，

由$|z|=1$，得 $a^2+b^2=1$，　①

由 $(3+4i)\cdot z=(3+4i)(a+bi)=(3a-4b)+(4a+3b)i$ 是纯虚数，得 $3a-4b=0$，且 $4a+3b\neq0$.　②

联立①②解得$\begin{cases}a=-\frac{4}{5},\\b=-\frac{3}{5},\end{cases}$或$\begin{cases}a=\frac{4}{5},\\b=\frac{3}{5}.\end{cases}$

所以 $z=-\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$ 或 $z=\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$.

18.**证明**：$2\cos\frac{\pi}{4}=2\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$，

$2\cos\frac{\pi}{8}=2\sqrt{\frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2}}$

$=2\cdot\sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}}=\sqrt{2+\sqrt{2}}$，

$2\cos\frac{\pi}{16}=2\sqrt{\frac{1+\cos\frac{\pi}{8}}{2}}$

$=2\sqrt{\frac{1+\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}$

$=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}$，

…

归纳一般性的结论：

$2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}=\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}}_{n\text{个}2}$.

19.**解**：由 $z=1+i$，可知$\bar{z}=1-i$，代入 $az+2b\bar{z}=(a+2z)^2$，得 $a(1+i)+2b(1-i)=[a+2(1+i)]^2$，即 $a+2b+(a-2b)i=(a+2)^2-4+4(a+2)i$.

所以$\begin{cases}a+2b=(a+2)^2-4,\\a-2b=4(a+2),\end{cases}$

解得$\begin{cases}a=-4,\\b=2,\end{cases}$或$\begin{cases}a=-2,\\b=-1.\end{cases}$

20.**证明**：已知 $a>b>c$，因为$\frac{a-c}{a-b}+\frac{a-c}{b-c}=\frac{a-b+b-c}{a-b}+\frac{a-b+b-c}{b-c}=2+\frac{b-c}{a-b}+\frac{a-b}{b-c}\geqslant2+2\sqrt{\frac{b-c}{a-b}\cdot\frac{a-b}{b-c}}=4$，

所以$\frac{a-c}{a-b}+\frac{a-c}{b-c}\geqslant4$，

即$\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}\geqslant\frac{4}{a-c}$.

21.**解**：设该容器底面的一边长为 xm，则另一边长为$(x+0.5)$m，此容器的高为 $h=\frac{14.8}{4}-x-(x+0.5)=3.2-2x(0<x<1.6)$.

于是，此容器的容积为 $V(x)=x(x+0.5)(3.2-2x)=-2x^3+2.2x^2+1.6x$，其中 $0<x<1.6$.

由 $V'(x)=-6x^2+4.4x+1.6=0$，得 $x=1$ 或 $x=-\frac{4}{15}$(舍去).

因为 $V(x)$在$(0,1.6)$内只有一个极值点，且 $x\in(0,1)$时，$V'(x)>0$，函数 $V(x)$单调递增；$x\in(1,1.6)$时，$V'(x)<0$，函数 $V(x)$单调递减.

所以，当 $x=1$ 时，函数 $V(x)$有最大值 $V(1)=1\times(1+0.5)\times(3.2-2\times1)=1.8(\text{m}^3)$，$h=3.2-2=1.2(\text{m})$.

即当高为 1.2m 时，长方体容器的容积最大，最大容积为 1.8m^3.

22.**解**：(1)$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=2ae^{2x}+(a-2)e^x-1=(ae^x-1)(2e^x+1)$.

(i)若 $a\leqslant0$，则 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$单调递减.

(ii)若 $a>0$，则由 $f'(x)=0$，得 $x=-\ln a$.

当 $x\in(-\infty,-\ln a)$时，$f'(x)<0$；当 $x\in(-\ln a,+\infty)$时，$f'(x)>0$.

所以 $f(x)$在$(-\infty,-\ln a)$单调递减，在$(-\ln a,+\infty)$单调递增.

(2)(i)若 $a\leqslant0$，由(1)知，$f(x)$至多有一个零点.

(ii)若 $a>0$，由(1)知，当 $x=-\ln a$时，$f(x)$取得最小值，最小值为 $f(-\ln a)=1-\frac{1}{a}+\ln a$.

①当 $a=1$ 时，由于 $f(-\ln a)=0$，故 $f(x)$只有一个零点；

②当 $a\in(1,+\infty)$时，$1-\frac{1}{a}+\ln a>0$，即 $f(-\ln a)>0$，故 $f(x)$没有零点；

③当 $a\in(0,1)$时，$1-\frac{1}{a}+\ln a<0$，即 $f(-\ln a)<0$.

又 $f(-2)=ae^{-4}+(a-2)e^{-2}+2>-2e^{-2}+2>0$，故 $f(x)$在$(-\infty,-\ln a)$有一个零点.

设正整数 n_0 满足 $n_0>\ln(\frac{3}{a}-1)$，则 $f(n_0)=e^{n_0}(ae^{n_0}+a-2)-n_0>e^{n_0}-n_0>2^{n_0}-n_0>0$.

由于 $\ln\left(\frac{3}{a}-1\right)>-\ln a$，因此 $f(x)$在$(-\ln a,+\infty)$有一个零点.

综上，a 的取值范围为$(0,1)$.

第 12 期

第 2、3 版　综合检测题(二)参考答案

一、选择题

1.B

2.D

3.D

提示：由归纳推理可知，第 k 项的第一个数为 a^{k-1}，且共有 k 项.故选 D.

4.B

5.A

提示：依题意 $3-4i=\lambda(-1+2i)+\mu(1-i)=\mu-\lambda+(2\lambda-\mu)i$，

所以$\begin{cases}\mu-\lambda=3,\\2\lambda-\mu=-4,\end{cases}$所以$\begin{cases}\lambda=-1,\\\mu=2,\end{cases}$

所以 $\lambda+\mu=1$.

6.B

7.D

提示：②中$|z|^2\in\mathbf{R}$，但 z^2 不一定是实数.③中复数集不能比较大小，不能用 b^2-4ac 来确定根的个数.

8.B

9.B

提示：若存在实数 m，使直线 l 是曲线 $y=f(x)$的切线，因为 $f'(x)=2\sin x\cos x+$