

第5期

第2~3版同步周测参考答案

一、选择题

1~6.CAADAC 7~12.BBDDAA

二、填空题


13.  $(-\frac{1}{3}, 1)$

14.  $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

15.2

16.2

提示:函数  $f(x) = |\log_a|x-1||$  ( $a>0$ , 且  $a \neq 1$ ) 的图象如图所示.



(第16题图)

由  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow |\log_a|x_1-1|| = |\log_a|x_2-1||$ , 且  $|x_1-1| > 1, 0 < |x_2-1| < 1$ , 所以必有  $\log_a|x_1-1| = -\log_a|x_2-1|$ , 所以  $\log_a|x_1-1| + \log_a|x_2-1| = 0 \Rightarrow (1-x_1)(1-x_2) = 1$ ,

所以  $x_1x_2 - (x_1+x_2) + 1 = 1 \Rightarrow x_1x_2 - (x_1+x_2) = 0 \Rightarrow \frac{x_1+x_2}{x_1x_2} = 1$ , 即  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 1$ .

同理, 可得  $\frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = 1$ .

所以  $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = 2$ .

三、解答题

17.解:(1)原式  $= (\sqrt{3})^6 \times (\sqrt[3]{2})^6 = 7 \times \left(\frac{4}{7}\right)^2 \Big|_{-2}^{103} = 2018^0 = 3^3 \times 2^2 = 7 \times \frac{4}{7} = 103$ .

(2)  $2\log_2 2 - \log_3 \frac{32}{9} + \log_3 8 - \log_3 \frac{1}{81} = \log_3 4 + \log_3 \frac{9}{32} + \log_3 8 - \log_3 3^{-4} = \log_3 (4 \times 8 \times \frac{9}{32}) + 4 = 2 + 4 = 6$ .

18.解:(1)根据题意,  $m \in \mathbb{N}_+$ , 则  $m^2 + m = m(m+1)$  为正偶数, 所以  $\frac{1}{m^2+m} > 0$ , 所以  $f(x)$  的定义域为  $[0, +\infty)$ ,

所以幂函数  $f(x) = x^{\frac{1}{m^2+m}}$  的单调递增区间为  $[0, +\infty)$ , 无单调递减区间.

(2)若该函数经过点  $(2, \sqrt{2})$ , 即  $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{m^2+m}}$ , 解得  $m=1$ , 则  $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ .

若  $f(2-a) > f(a-1)$ , 则有  $2-a > a-1 \geq 0$ , 解得  $1 \leq a < \frac{3}{2}$ , 即实数  $a$  的取值范围

为  $[1, \frac{3}{2})$ .

19.解:(1)因为函数  $y=c\left(\frac{1}{2}\right)^m$  ( $c, m$  为常数) 经过点  $(4, 64), (8, 32)$ ,

所以  $\begin{cases} 64 = c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{4m}, \\ 32 = c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{8m}, \end{cases}$

解得  $m = \frac{1}{4}, c = 128$ .

(2)由(1)得  $y = 128\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{4}t}$ ,

所以  $128\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{4}t} \leq \frac{1}{2}$ , 解得  $t \geq 32$ .

故至少排气 32 分钟, 这个地下车库中的一氧化碳含量才能达到正常状态.

20.解:(1)因为  $f(x)$  为偶函数, 所以对任意的  $x \in \mathbb{R}$ , 都有  $f(x) = f(-x)$ , 即  $a^{x+b} = a^{-x+b}$ ,

等价于  $|x+b| = |-x+b|$ , 所以  $b=0$ .

(2)记  $h(x) = |x+b| = \begin{cases} x+b, & x \geq -b, \\ -x-b, & x < -b. \end{cases}$

①当  $a>1$  时, 因为  $f(x)$  在区间  $[2, +\infty)$  上是增函数, 所以  $h(x)$  在区间  $[2, +\infty)$  上也是增函数,

所以  $-b \leq 2$ , 所以  $b \geq -2$ ;

②当  $0 < a < 1$  时, 因为  $f(x)$  在区间  $[2, +\infty)$  上是增函数,

所以  $h(x)$  在区间  $[2, +\infty)$  上是减函数, 但  $h(x)$  在区间  $[-b, +\infty)$  上是增函数, 故不可能.

综上,  $f(x)$  在区间  $[2, +\infty)$  上是增函数时,  $a, b$  应满足的条件为  $a>1$  且  $b \geq -2$ .

21.解:(1)  $F(x) = 2\log_a(x+1) + \log_a \frac{1}{1-x}$  ( $a>0$  且  $a \neq 1$ ),

由  $\begin{cases} x+1 > 0, \\ 1-x > 0, \end{cases}$  解得  $-1 < x < 1$ , 所以函数  $F(x)$  的定义域为  $(-1, 1)$ . 令  $F(x) = 0$ ,

则  $2\log_a(x+1) + \log_a \frac{1}{1-x} = 0$ , (\*) 方程等价于  $\log_a(x+1)^2 = \log_a(1-x)$ , 即  $(x+1)^2 = 1-x$ , 解得  $x_1=0, x_2=-3$  (舍去). 综上, 函数  $F(x)$  的定义域  $D$  为  $(-1, 1)$ , 零点是  $x=0$ .

(2)  $m = 2\log_a(x+1) + \log_a \frac{1}{1-x} = \log_a\left(1-x + \frac{4}{1-x} - 4\right)$  ( $0 \leq x < 1$ ),

则  $a^m = 1-x + \frac{4}{1-x} - 4$ .

设  $1-x=t \in (0, 1]$ ,

则函数  $y=t + \frac{4}{t}$  在区间  $(0, 1]$  内是减函数,

当  $t=1$ , 即  $x=0$  时,  $y_{\min}=5$ , 所以  $a^m \geq 5-4=1$ .

所以当  $a>1$  时,  $m \geq 0$ , 方程有解; 当  $0 < a < 1$  时,  $m \leq 0$ , 方程有解.

综上, 当  $a>1$  时, 实数  $m$  的取值范围是  $[0, +\infty)$ ; 当  $0 < a < 1$  时, 实数  $m$  的取值范围是  $(-\infty, 0]$ .

22.(1)证明: 令  $\log_a x = t$ , 得  $x = a^t$ , 所以  $f(t) = \frac{a}{a^2-1} (a^t - a^{-t})$ ,

即  $f(x) = \frac{a}{a^2-1} (a^x - a^{-x})$ , 所以  $f'(x) =$

$\frac{a}{a^2-1} (a^x \ln a + a^{-x} \ln a) = \frac{a \ln a}{a^2-1} (a^x + a^{-x})$ .

①若  $0 < a < 1$ , 则  $a \ln a < 0, a^2-1 < 0$ , 所以  $\frac{a \ln a}{a^2-1} > 0$ ,

又  $a^x + a^{-x}$  始终大于 0, 所以  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上单调递增;

②若  $a>1$ , 则  $a \ln a > 0, a^2-1 > 0$ , 所以  $\frac{a \ln a}{a^2-1} > 0, f'(x) > 0, f(x)$  单调递增.

综上,  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上单调递增.

(2)解: 假设存在实数  $m$  满足: 当  $y = f(x)$  的定义域为  $(-1, 1)$  时,  $f(1-m) + f(1-m^2) < 0$ ,

因为  $f(-x) = \frac{a}{a^2-1} (a^{-x} - a^x) = -f(x)$ ,

所以  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的奇函数; 可得  $f(1-m^2) < -f(1-m) = f(m-1)$ , 由  $f(x)$  为  $\mathbb{R}$  上的增函数, 即有  $-1 < 1-m^2 < m-1 < 1$ ,

即为  $\begin{cases} -\sqrt{2} < m < \sqrt{2}, \\ m > 1 \text{ 或 } m < -2, \\ m < 2, \end{cases}$  解得  $1 < m < \sqrt{2}$ ,

所以存在实数  $m$  满足: 当  $y = f(x)$  的定义域为  $(-1, 1)$  时,  $f(1-m) + f(1-m^2) < 0$ , 且  $m$  的取值范围是  $(1, \sqrt{2})$ .

(3)解: 因为  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的增函数, 函数  $y = f(x) - 4$  恰好在  $(-\infty, 2)$  上取负值, 由  $x < 2$ , 得  $f(x) - 4 < f(2) - 4$ , 要使  $f(x) - 4$  的值恰为负数, 则  $f(2) - 4 = 0$ ,

即  $f(2) = \frac{a}{a^2-1} (a^2 - a^{-2}) = 4$ , 即为  $a^2 - 4a + 1 = 0$ , 解得  $a = 2 \pm \sqrt{3}$ .

19.解:(1)因为  $f'(x) = -\frac{m}{e^x} + n$ , 所以  $f'(0) = n - m$ , 即  $n - m = -3$ . 又  $f(0) = m$ , 故切点坐标是  $(0, m)$ , 因为切点在直线  $y = -3x + 2$  上, 所以  $m = 2, n = -1$ .

(2)因为  $f(x) = \frac{m}{e^x} + x$ , 所以  $f'(x) = \frac{e^x - m}{e^x}$ . 当  $m \leq 0$  时,  $f'(x) > 0$ , 故函数  $f(x)$  在  $(-\infty, 1)$  上单调递增, 令  $x_0 = a < 0$ , 此时  $f(x_0) < 0$ , 符合题意.

当  $m > 0$  时, 函数  $f(x)$  在  $(-\infty, \ln m)$  上单调递减, 在  $(\ln m, +\infty)$  上单调递增. ①当  $\ln m < 1$ , 即  $0 < m < e$  时, 则函数  $f(x)$  在  $(-\infty, \ln m)$  上单调递减, 在  $(\ln m, 1]$  上单调递增,  $[f(x)]_{\min} = f(\ln m) = \ln m + 1 < 0$ , 解得  $0 < m < \frac{1}{e}$ .

②当  $\ln m \geq 1$ , 即  $m \geq e$  时, 函数  $f(x)$  在区间  $(-\infty, 1)$  上单调递减, 则函数  $f(x)$  在区间  $(-\infty, 1)$  上的最小值是  $f(1) = \frac{m}{e} + 1 < 0$ , 解得  $m < -e$ , 无解.

综上, 实数  $m$  的取值范围是  $(-\infty, \frac{1}{e})$ .

20.(1)证明: 由  $h(x) = f(x) - g(x) = e^x - 1 - \sqrt{x} - x$ , 得  $h(1) = e - 3 < 0, h(2) = e^2 - 3 - \sqrt{2} > 0$ , 所以函数  $h(x)$  在区间  $(1, 2)$  上有零点.

(2)解: 由(1)得  $h(x) = e^x - 1 - \sqrt{x} - x$ .

由  $g(x) = \sqrt{x} + x$ , 知  $x \in [0, +\infty)$ , 而  $h(0) = 0$ , 则  $x=0$  为  $h(x)$  的一个零点, 又  $h(x)$  在  $(1, 2)$  内有零点, 因此  $h(x)$  在  $[0, +\infty)$  上至少有两个零点. 因为  $h'(x) = e^x - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - 1$ , 记  $\varphi(x) = e^x - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - 1$ , 则  $\varphi'(x) = e^x + \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$ . 当  $x \in (0, +\infty)$  时,  $\varphi'(x) > 0$ , 因此  $\varphi(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 则  $\varphi(x)$  在  $(0, +\infty)$  内至多只有一个零点, 即  $h(x)$  在  $[0, +\infty)$  至多有两个零点. 所以  $h(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有两个零点, 所以方程  $f(x) = g(x)$  的根的个数为 2.

21.(1)解:  $f(x)$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ,  $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{a}{x} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}$ .

令  $g(x) = x^2 - ax + 1$ , 显然当  $a \leq 0$  时,  $g(x) > 0$ , 即  $f'(x) < 0$  恒成立, 此时函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调递减;

当  $a > 0$  时, 令  $g(x) = 0$ , 则  $\Delta = a^2 - 4$ .

(i)若  $0 < a \leq 2$  时,  $\Delta \leq 0$ , 即  $g(x) \geq 0$ , 所以  $f'(x) \leq 0$ , 此时  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调递减.

(ii)若  $a > 2$ , 令  $g(x) = 0$ , 得  $x = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ , 或  $x = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ .

当  $x \in (0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}) \cup (\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty)$  时,  $f'(x) < 0$ ;

当  $x \in (\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2})$  时,  $f'(x) > 0$ .

所以  $f(x)$  在  $(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2})$ ,  $(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty)$  单调递减, 在  $(\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2})$  单调递增.

综上, 当  $a \leq 2$  时,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调

递减; 当  $a > 2$  时,  $f(x)$  在  $(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2})$ ,

$(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty)$  单调递减, 在  $(\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2})$  单调递增.

(2)证明: 由(1)知,  $f(x)$  存在两个极值点当且仅当  $a > 2$ .

因为  $f(x)$  的两个极值点  $x_1, x_2$  满足  $x^2 - ax + 1 = 0$ , 所以  $x_1x_2 = 1$ , 不妨设  $x_1 < x_2$ , 则  $x_2 > 1$ .

因为  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{x_1x_2} - 1 + a = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{-2 \ln x_2}{\frac{1}{x_2} - x_2}$ ,

所以  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$  等价于  $\frac{1}{x_2} - x_2 + 2 \ln x_2 < 0$ .

设函数  $h(x) = \frac{1}{x} - x + 2 \ln x$ , 由(1)知,  $h(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调递减, 又  $h(1) = 0$ , 从而当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $h(x) < 0$ . 所以  $\frac{1}{x_2} - x_2 + 2 \ln x_2 < 0$ , 即  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$ .

22.(1)证明: 由题意知  $f(x) = a(x-1) + x \ln x + 1$ , 所以  $f'(x) = a + 1 + \ln x$ .

令  $f'(x) = a + 1 + \ln x = 0$ , 得  $x = e^{-(a+1)}$ .

显然,  $x \in (0, e^{-(a+1)})$  时,  $f'(x) < 0$ , 函数  $f(x)$  单调递减;  $x \in (e^{-(a+1)}, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ , 函数  $f(x)$  单调递增.

所以  $[f(x)]_{\min} = f(e^{-(a+1)}) = 1 - a - e^{-(a+1)}$ . 令  $t(a) = [f(x)]_{\min}$ , 则由  $t'(a) = -1 + e^{-(a+1)} = 0$ , 得  $a = -1$ . 当  $a \in (-\infty, -1)$  时,  $t'(a) > 0$ , 函数  $t(a)$  单调递增;  $a \in (-1, +\infty)$  时,  $t'(a) < 0$ , 函数  $t(a)$  单调递减.

所以  $[t(a)]_{\max} = t(-1) = 1 + 1 - 1 = 1$ , 即结论成立.

(2)解: 假设存在满足条件的整数  $k$ , 由题设化简可得  $k < \frac{x + x \ln x}{x - 2}$ , 令  $h(x) = \frac{x + x \ln x}{x - 2}$ ,

则  $h'(x) = \frac{x - 4 - 2 \ln x}{(x - 2)^2}$ .

令  $g(x) = x - 4 - 2 \ln x$ .

又  $g'(x) = 1 - \frac{2}{x}$ , 所以  $x > 2$  时,  $g'(x) > 0$ ,  $g(x)$  单调递增,

因为  $g(8) = 4 - 2 \ln 8 = \ln e^4 - \ln 8^2 < 0, g(9) = 5 - 2 \ln 9 = \ln e^5 - \ln 9^2 > 0$ , 设  $x - 4 - 2 \ln x = 0$  并记其零点为  $x_0$ , 故  $8 < x_0 < 9$ , 且  $\ln x_0 = \frac{x_0 - 4}{2}$ .

所以当  $2 < x < x_0$  时,  $g(x) < 0$ , 即  $h'(x) < 0, h(x)$  单调递减;

当  $x > x_0$  时,  $g(x) > 0$ , 即  $h'(x) > 0, h(x)$  单调递增.

所以  $[h(x)]_{\min} = h(x_0) = \frac{x_0 + x_0 \cdot \frac{x_0 - 4}{2}}{x_0 - 2} = \frac{x_0}{2}$ ,

因此  $k < \frac{x_0}{2}$ , 由于  $k \in \mathbb{Z}$  且  $8 < x_0 < 9$ , 即

$4 < \frac{x_0}{2} < \frac{9}{2}$ , 所以  $k$  的最大值为 4.

故存在满足条件的整数  $k$ , 且  $k$  的最大值为 4.

第 6 期  
第2~3版同步周测参考答案

一、选择题

1~6.CCCCCD 7~12.CACDCC

二、填空题

13.2

14.3

15.24

16.-3

三、解答题

17.解:原方程可化为 $(\lg a + \lg x) \cdot (\lg a + 2\lg x) = 4$ ,

即  $2(\lg x)^2 + 3\lg a \cdot \lg x + (\lg a)^2 - 4 = 0$ .

令  $\lg x = t$ , 因为  $x > 1$ , 所以  $t > 0$ ,

则有  $2t^2 + 3\lg a \cdot t + (\lg a)^2 - 4 = 0$  的解都是正数.

设  $f(t) = 2t^2 + 3\lg a \cdot t + (\lg a)^2 - 4$ ,

$\Delta = (3\lg a)^2 - 8[(\lg a)^2 - 4] \geq 0$ ,

则  $\begin{cases} -\frac{3\lg a}{4} > 0, \\ f(0) = (\lg a)^2 - 4 > 0, \end{cases}$

解得  $\lg a < -2$ , 所以  $0 < a < \frac{1}{100}$ ,

所以实数  $a$  的取值范围是  $(0, \frac{1}{100})$ .

18.解:(1)由题意,知  $b = 4^x - 2^{x+1}$ .

因为  $4^x - 2^{x+1} = (2^x)^2 - 2 \times 2^x = (2^x - 1)^2 - 1 \geq -1$ ,  
所以当  $b \in [-1, +\infty)$  时,方程有实数解.

(2)①当  $b = -1$  时,  $2^x = 1$ , 所以此时方程有唯一解  $x = 0$ ;

②当  $b > -1$  时, 因为  $(2^x - 1)^2 = 1 + b \Rightarrow 2^x = 1 \pm \sqrt{1+b}$ , 因为  $2^x > 0, 1 + \sqrt{1+b} > 0$ , 所以  $2^x = 1 + \sqrt{1+b}$  的解为  $x = \log_2(1 + \sqrt{1+b})$ .

令  $1 - \sqrt{1+b} > 0 \Rightarrow \sqrt{1+b} < 1 \Rightarrow -1 < b < 0$ ,

所以当  $-1 < b < 0$  时,  $2^x = 1 - \sqrt{1+b}$  的解为  $x = \log_2(1 - \sqrt{1+b})$ .

综上, 得当  $-1 < b < 0$  时原方程有两解,  
 $x = \log_2(1 \pm \sqrt{1+b})$ ; 当  $b \geq 0$  或  $b = -1$  时, 原方程有唯一解  $x = \log_2(1 + \sqrt{1+b})$ ; 当  $b < -1$  时, 原方程无解.

19. 解:(1) 当每张门票售价为 100 元时, 销售量可达到  $15 - 0.1 \times 100 = 5$  万张.

令每张门票的浮动价格为  $\frac{k}{5}$  ( $k > 0$ ) 元,

则每张门票供货价格为  $(30 + \frac{k}{5})$  元.

故旅游公司获得的总利润为  $5 \times \left[ 100 - (30 + \frac{k}{5}) \right] = 350 - k = 340$ , 解得  $k = 10$ .

所以  $f(x) = x - (30 + \frac{10}{15 - 0.1x})$ ,  $x < 150$ ,  
 $x \in \mathbf{N}$ .

(2) 由 (1) 可知:

$f(x) = x - \frac{100}{150 - x} - 30 = -[(150 - x) + \frac{100}{150 - x}] + 120 \leq -2\sqrt{(150 - x) \cdot \frac{100}{150 - x}} + 120 = 100$ , 当且仅当  $150 - x = 10$ , 解得  $x = 140$  时取等号,

因此每张门票售价为 140 元时, 每张门票所获利润最大, 最大值为 100 元.

20. 解:(1)  $h(x) = \log_a(x - 1) - \log_{\frac{1}{a}}(3 - x) =$

$\log_a(x - 1)(3 - x)$ ,

由  $\begin{cases} x - 1 > 0, \\ 3 - x > 0, \end{cases}$  得  $1 < x < 3$ , 所以函数  $h(x)$  的定义域为  $(1, 3)$ .

令  $t = (x - 1)(3 - x)$ , 而  $x \in (1, 3)$ , 所以  $t \in (0, 1]$ .

当  $0 < a < 1$  时,  $\log_a t \geq 0$ , 即  $h(x) \geq 0$ ,

当  $a > 1$  时,  $\log_a t \leq 0$ , 即  $h(x) \leq 0$ ,

所以当  $0 < a < 1$  时, 函数  $h(x)$  的值域为  $[0, +\infty)$ ; 当  $a > 1$  时, 函数  $h(x)$  的值域为  $(-\infty, 0]$ .

(2) 由  $f(x) + g(x) \geq 0$ , 得  $f(x) \geq -g(x)$ ,  
即  $\log_a(x - 1) \geq \log_a(3 - x)$ , ①

当  $0 < a < 1$  时, 要使不等式 ① 成立,

$\begin{cases} x - 1 > 0, \\ 3 - x > 0, \end{cases}$  即  $1 < x \leq 2$ ;  
 $x - 1 \leq 3 - x$ ,

当  $a > 1$  时, 要使不等式 ① 成立,

$\begin{cases} x - 1 > 0, \\ 3 - x > 0, \end{cases}$  即  $2 \leq x < 3$ .  
 $x - 1 \geq 3 - x$ ,

综上所述, 当  $0 < a < 1$  时, 不等式  $f(x) + g(x) \geq 0$  中  $x$  的取值范围为  $(1, 2]$ ; 当  $a > 1$  时, 不等式  $f(x) + g(x) \geq 0$  中  $x$  的取值范围为  $[2, 3)$ .

21. 解:(1) 当  $x \leq 0$  时,  $f(x) + 1 = 0$ , 所以  $2x + 1 + 1 = 0$ , 所以  $x = -1$ ;

当  $x > 0$  时,  $f(x) + 1 = 0$ , 所以  $\lg x + 1 = 0$ , 所以  $x = 0.1$ , 所以  $y = f(x) + 1$  的零点是  $-1, 0.1$ .

(2) 当  $x \leq 0$  时,  $f(x) \in (-\infty, 1]$ ; 当  $x > 0$  时,  $f(x) \in (-\infty, +\infty)$ , 画出  $f(x)$  的图象如图所示, 令  $f(f(x)) + a = 0$ , 即  $f(f(x)) = -a$ , 令  $f(x) = t$ , 则  $f(t) = -a$ .

① 当  $-a > 1$  时, 有唯一的  $t_1 = f(x_1) > 10$ , 此时有唯一解;

② 当  $0 < -a \leq 1$ , 方程  $f(t) = -a$  有两个解  $t_1, t_2$ , 且  $-\frac{1}{2} < t_1 = f(x_1) \leq 0, 1 < t_2 = f(x_2) \leq 10$ ;

若  $-\frac{1}{2} < t_1 = f(x_1) \leq 0$ , 有两解,  $-\frac{3}{4} <$

$x_1 \leq -\frac{1}{2}$  或  $\frac{\sqrt{10}}{10} < x_1 \leq 1$ ;

若  $1 < t_2 = f(x_2) \leq 10$ , 有唯一解,  $10 < x_2 \leq 100$ , 共有 3 个解, 所以  $-1 \leq a < 0$ ;

③ 当  $-a \leq 0$  时, 方程  $f(t) = -a$ , 有两个解

$t_1, t_2$ , 且  $t_1 = f(x_1) \leq -\frac{1}{2}, 0 < t_2 = f(x_2) \leq 1$ ,


若  $t_1 = f(x_1) \leq -\frac{1}{2}$ , 有两解,  $x_1 \leq -\frac{3}{4}$  或

$0 < x_1 \leq \frac{\sqrt{10}}{10}$ ;

若  $0 < t_2 = f(x_2) \leq 1$ , 有两解,  $-\frac{1}{2} < x_2 \leq 0$

或  $1 < x_2 \leq 10$ , 即共有 4 个解.

综上, 实数  $a$  的取值范围是  $[-1, 0)$ .



(第 21 题图)

22. 解:(1) 当  $a = 1$  时,  $f(x) = x^3 + x^2 - x + m$ ,  
因为  $f(x)$  有三个互不相同的零点,

所以方程  $x^3 + x^2 - x + m = 0$  有三个互不相同的实数根, 即  $y = -x^3 - x^2 + x$  与  $y = m$  的图象有三个交点.

令  $g(x) = -x^3 - x^2 + x$ ,  
则  $g'(x) = -3x^2 - 2x + 1 = -(3x - 1)(x + 1)$ .

令  $g'(x) > 0$ , 得  $-1 < x < \frac{1}{3}$ ;

令  $g'(x) < 0$ , 得  $x < -1$ , 或  $x > \frac{1}{3}$ .

所以  $g(x)$  在  $(-\infty, -1)$  和  $(\frac{1}{3}, +\infty)$  上

为减函数, 在  $(-1, \frac{1}{3})$  内为增函数, 所以

$[g(x)]_{\text{最小值}} = g(-1) = -1, [g(x)]_{\text{最大值}} = g(\frac{1}{3}) =$

$\frac{5}{27}$ , 所以  $-1 < m < \frac{5}{27}$ .

所以实数  $m$  的取值范围是  $(-1, \frac{5}{27})$ .

(2)  $f'(x) = 3x^2 + 2ax - a^2$ , 由题设可知, 方程  $3x^2 + 2ax - a^2 = 0$  ( $a > 0$ ) 在  $[-1, 1]$  上没有实数根.

方程  $3x^2 + 2ax - a^2 = 0$  的根为  $x_1 = -a < 0$ ,

$x_2 = \frac{a}{3} > 0$ . 若方程  $f'(x) = 0$  在  $[-1, 1]$  上没有

实数根, 则  $-a < -1$ , 且  $\frac{a}{3} > 1$ , 解得  $a > 3$ .

所以实数  $a$  的取值范围是  $(3, +\infty)$ .

数学·高考版(文)答案页第 2 期

第 7 期

第2~3版同步周测参考答案

一、选择题

1~6.CABDCC 7~12.DDDDDDD

二、填空题

13.(-2,9) 14.3 15.-3

16.②③

提示: 当  $a = 1$  时,  $f(x) = e^x + \ln x$ , 易知函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 无最大值, 故 ① 错误; 对于任意的  $a > 0$ , 函数  $f(x)$  是  $(0, +\infty)$  上的增函数, 当  $x \rightarrow 0$  时,  $e^x \rightarrow 1, \ln x \rightarrow -\infty$ , 故  $f(x) \rightarrow -\infty$ , 故 ② 正确, ④ 错误; 对于任意的  $a < 0$ ,  $f'(x) = e^x + \frac{a}{x}$ , 又  $f''(x) = e^x - \frac{a}{x^2}$ , 所以  $f''(x) > 0$ , 所以  $f'(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调递增, 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x) \rightarrow +\infty$ , 当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) \rightarrow -\infty$ , 所以存在  $f'(x_0) = 0$ , 当  $0 < x < x_0$  时,  $f'(x) < 0$ , 函数单调递减; 当  $x > x_0$  时,  $f'(x) > 0$ , 函数单调递增, 所以  $[f(x)]_{\min} = f(x_0)$ , 故 ③ 正确.

三、解答题

17. 解:(1) 化简, 得  $f(x) = \frac{2e^x}{1-x}$ .

因为  $f'(x) = \left( \frac{2e^x}{1-x} \right)' = \frac{(2e^x)'(1-x) - 2e^x(1-x)'}{(1-x)^2} = \frac{2(2-x)e^x}{(1-x)^2}$ ,

所以  $f'(2) = 0$ .

(2) 因为  $f'(x) = \left( x^{-\frac{3}{2}} \right)' - x' + (\ln x)'$

$= -\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}} - 1 + \frac{1}{x}$ ,

所以  $f'(1) = -\frac{3}{2}$ .

18. 解:  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ,  $g'(x) = \frac{a}{x}$  ( $x > 0$ ).

由已知, 得  $\begin{cases} \sqrt{x} = a \ln x, \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{a}{x}, \end{cases}$

解得  $a = \frac{e}{2}$ ,  $x = e^2$ .

所以两条曲线的交点坐标为  $(e^2, e)$ ,

切线的斜率  $k = f'(e^2) = \frac{1}{2e}$ ,

所以切线的方程为  $y - e = \frac{1}{2e}(x - e^2)$ ,

即  $\frac{x}{2e} - y + \frac{e}{2} = 0$ .

19. (1) 解: 函数  $f(x)$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ,  $f'(x) = ae^{\ln x} + \frac{a}{x}e^{-\frac{b}{x^2}} - \frac{b}{x^2}e^{x-1} + \frac{b}{x}e^{x-1}$ ,

由题意可得  $f(1) = 2, f'(1) = e$ ,

则  $\begin{cases} b = 2, \\ ae - b + b = e, \end{cases}$  解得  $a = 1, b = 2$ .

(2) 证明: 由 (1), 知  $f(x) = e^x \ln x + \frac{2}{x}e^{x-1}$ ,

从而  $f(x) > 1$  等价于  $x \ln x > xe^{-x} - \frac{2}{e}$ .

设函数  $g(x) = x \ln x$ , 则  $g'(x) = 1 + \ln x$ ,

所以当  $x \in (0, \frac{1}{e})$  时,  $g'(x) < 0$ ;

当  $x \in (\frac{1}{e}, +\infty)$  时,  $g'(x) > 0$ .

故  $g(x)$  在  $(0, \frac{1}{e})$  上单调递减,

在  $(\frac{1}{e}, +\infty)$  上单调递增,

从而  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的最小值为  $g(\frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}$ .

设函数  $h(x) = xe^{-x} - \frac{2}{e}$ ,

则  $h'(x) = e^{-x}(1-x)$ .

所以当  $x \in (0, 1)$  时,  $h'(x) > 0$ ;

当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $h'(x) < 0$ ,

故  $h(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递增,

在  $(1, +\infty)$  上单调递减,

从而  $h(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的最大值为

$h(1) = -\frac{1}{e}$ .

综上, 当  $x > 0$  时,  $g(x) > h(x)$ , 即  $f(x) > 1$ .

20. 解:(1)  $f'(x) = ax^2 + x - 1$ , 由  $f(x)$  与  $y = -3$  切于点  $A(x_0, f(x_0))$ ,

则  $\begin{cases} f(x_0) = \frac{1}{3}ax_0^3 + \frac{1}{2}x_0^2 - x_0 - 3 = -3, \\ f'(x_0) = ax_0^2 + x_0 - 1 = 0, \end{cases}$

解得  $a = -\frac{3}{16}$ ,  $x_0 = 4$ .

(2)  $F(x) = (ax^2 + x - 1) \cdot e^x$ ,  
所以  $F'(x) = e^x[ax^2 + (2a+1)x]$ ,  
且  $F(0) = -1$ .

① 当  $a = 0$  时,  $F'(x) = xe^x$ , 因为  $x \in (0, +\infty)$ , 所以  $F'(x) > 0$ , 所以  $F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 此时  $F(x) > -1$  成立;

② 当  $-\frac{1}{2} < a < 0$  时,  $F'(x) = e^x \cdot ax(x + \frac{2a+1}{a})$ , 可知  $F(x)$  在  $(0, -\frac{2a+1}{a})$  上单

调递增, 在  $(-\frac{2a+1}{a}, +\infty)$  上单调递减, 此时

$F(-\frac{1}{a}) = -e^{-\frac{1}{a}} < -1$ , 不符合条件;

③ 当  $a = -\frac{1}{2}$  时,  $F'(x) = e^x \cdot (-\frac{1}{2}x^2) < 0$  恒成立, 可知  $F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减, 此时  $F(x) < -1$  成立, 不符合条件;

④ 当  $a < -\frac{1}{2}$  时,  $F'(x) = e^x \cdot ax(x + \frac{2a+1}{a})$ , 可知  $F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递

减, 此时  $F(x) < -1$  成立, 不符合条件;

⑤ 当  $a > 0$  时,  $F'(x) = e^x \cdot ax(x + \frac{2a+1}{a})$ , 可知  $F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 此时  $F(x) > -1$  成立.

综上所述,  $a$  的取值范围是  $[0, +\infty)$ .

21. (1) 证明: 当  $a = 1$  时,  $f(x) \geq 1$ , 即

$e^x - x^2 \geq 1$ , 也就是  $e^x \geq 1 + x^2$ ,

两边同除  $e^x$  可知, 原式等价于  $(x^2 + 1) \cdot$

$e^{-x} - 1 \leq 0$ .

设函数  $g(x) = (x^2 + 1)e^{-x} - 1$ , 则  $g'(x) =$

$-(x^2 - 2x + 1)e^{-x} = -(x - 1)^2e^{-x}$ .

当  $x \neq 1$  时,  $g'(x) < 0$ , 所以  $g(x)$  在  $(0,$

$+\infty)$  单调递减.

而  $g(0) = 0$ , 故当  $x \geq 0$  时,  $g(x) \leq 0$ , 即

$f(x) \geq 1$ .

(2) 由  $f(x) = 0$ , 得  $a = \frac{e^x}{x^2}$ ,

所以  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上只有一个零

点, 等价于方程  $a = \frac{e^x}{x^2}$  只有一个实根.

令  $g(x) = \frac{e^x}{x^2}$ , 则  $g'(x) = \frac{e^x x^2 - 2e^x x}{(x^2)^2} =$

$\frac{e^x(x-2)}{x^3}$ ,

所以当  $x \in (0, 2)$  时,  $g(x)$  单调递减,

当  $x \in (2, +\infty)$  时,  $g(x)$  单调递增,

而  $g(2) = \frac{e^2}{4}$ , 所以当且仅当  $a = \frac{e^2}{4}$  时,

$f(x)$  在  $(0, +\infty)$  只有一个零点.

22. 解:(1) 由题意, 函数  $f(x) = xe^x$ ,

则  $g(x) = af'(x) + e^x = axe^x + e^x$ ,

所以  $g'(x) = (ax + a + 1)e^x$ .

① 若  $a = 0$ ,  $g'(x) = e^x$ ,  $g'(x) > 0$  在  $\mathbf{R}$  上恒

成立, 所以函数  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增;

② 若  $a > 0$ , 当  $x > -\frac{a+1}{a}$  时,  $g'(x) > 0$ ,

函数  $g(x)$  单调递增,

当  $x < -\frac{a+1}{a}$  时,  $g'(x) < 0$ , 函数  $g(x)$